BACTSOIL XV®

Campo-Track®
Precisión Vegetal

LINEA ORGÁNICA

DESCRIPCIÓN

BactSoil-XV® es un complejo biológico biomejorador de suelos a base del microorganismo Trichoderma harzianum/viride como agente de control para el Fusarium Oxysporum c. R4T. Su potente antibiosis, micoparasitismo, desactivación de enzimas de los patógenos y aceleración del desarrollo del sistema radicular posibilita la tolerancia al estrés por parte de la planta, solubilización y absorción de nutrientes inorgánicos como Nitrógeno, Fósforo y Potasio. Incrementa la descomposición de materia orgánica. Posee propiedades fungistáticas y nematófagas (control de nemátodos). Sólo BactSoil-XV posee el plus: Enzima citocromo P450 aumentando la tasa de oxigenación en suelos.

MECANISMO DE ACCIÓN

- Trichoderma harzianum/viride control preventivo Fusarium Oxysporum c. (R4T).
- Bacterias solubilizadoras de Nitrógeno, Fósforo, Potasio (desbloqueo).
- Hongos y Levaduras: Descomponen la materia orgánica a humus.
- Paecilomyces control de nemátodos.
- Estimulación del crecimiento vegetal e inducción de resistencia.

INDICACIONES ADICIONALES

BactSoil-XV® es compatible con enraizades y fertilizantes, para descomponer residuos de cosecha 2 L/Ha en 50 L de agua consecutivamente por 4 semanas.

ALMACENAMIENTO

Mantener en lugares frescos y secos, libre de rayos solares y precipitaciones. Temperatura promedio 25 ºC. Colocados sobre pallets de madera y separados a 15 cm, de las paredes.

RECOMENDACIONES

PRESENTACIÓN

- Litro
- Caneca 10 L
- Caneca 20 L
- Tanque 200 L

COMPOSICIÓN

Concentración	
Microorganismos benéficos	**Cantidad UFC/ML**
Trichoderma harzianum (CT-22®) Trichoderma viride	2×10^8
Bacterias Solubilizadoras de Potasio (Bacillus subtilis, Bacillus pumilus, Clostridium sp.)	1×10^8
Bacterias Ácido-Lácticas (Lactobacillus acidophillus, L. Casei, L. Paracasei)	2×10^8
Bacterias Nitifricantes (Azotobacter sp., Streptomyces sp., Rhizombium sp.	1×10^8
Bacterias Solubilizadoras de Fósforo (Pseudomonas sp., Kocuria sp., Penicillium)	1×10^8
Hongos y Levaduras (Saccharomyces cerevisiae, penicillium sp., Paecilomyces lilacinus)	3×10^9

MODO DE APLICACIÓN

CULTIVO	DOSIS	EPOCA DE APLICACIÓN	FORMA DE APLICACIÓN
BANANO (MUSA ACUMINATA)	4,00 L/HA	TODAS LAS ETAPAS FENOLÓGICAS	VÍA EDÁFICA/DRENCH /FERTIRIEGO
CACAO (THEOBRAMA CACAO)	4,00 L/HA	TODAS LAS ETAPAS FENOLÓGICAS	VÍA EDÁFICA/DRENCH /FERTIRIEGO
ARROZ (ORYZA SATIVA)	0,50 L/HA	ETAPA INICIAL DEL CULTIVO	VÍA EDÁFICA/DRENCH /FERTIRIEGO
MAÍZ (ZEA MAYS)	0,50 L/HA	ETAPA INICIAL DEL CULTIVO	VÍA EDÁFICA/DRENCH /FERTIRIEGO
MANGO (MANGIFERA INDICA)	1,00 L/HA	TODAS LAS ETAPAS FENOLÓGICAS	VÍA EDÁFICA/DRENCH /FERTIRIEGO
TABACO (NICOTIANA TABACUM)	1,00 L/HA	ETAPA INICIAL DEL CULTIVO	VÍA EDÁFICA/DRENCH /FERTIRIEGO
PIÑA (ANANAS COMUSUS L)	1,00 L/HA	ETAPA INICIAL DEL CULTIVO	VÍA EDÁFICA/DRENCH /FERTIRIEGO
PALMA AFRICANA (ELAEIS GUINEENSIS)	2,00 L/HA	TODAS LAS ETAPAS FENOLÓGICAS	VÍA EDÁFICA/DRENCH /FERTIRIEGO
OTROS	1,00 L/HA	TODAS LAS ETAPAS FENOLÓGICAS	VÍA EDÁFICA/DRENCH /FERTIRIEGO

Reg. Agrocalidad:
0552-F-AGR-G

Of.: Cdla. Puntilla. Cond. Puntilla Bay, D3
Planta: Km. 2 Vía Isla de Bejucal - Baba
Telf.: 05 305 8107 - 098 874 3670
E-mail: info@campo-track.com

Formulado y comercializado por:

Campo-Track®
Precisión Vegetal

www.campo-track.com